

醫心方卷第十二

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治消渴方第一

治湯利方第二

醫心方卷第十二

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治消渴方第一

治湯利方第二

治內消方第三

治諸淋方第四

治石淋方第五

治氣淋方第六

治勞淋方第七

治膏淋方第八

治血淋方第九

治熱淋方第十

治寒淋方第十一

治大少便不通方第十二

治大便不通方第十三

治大便難方第十四

治大便去禁方第十五

治大便下血方第十六

治小便不通方第十七

治小便難方第十八

治小便數方第十九

治小便不禁方第二十

治小便黃赤方第二十一

治小便血方第二十二

治遺尿方第二十三

治尿淋方第二十四

治消渴方第一

病源論云消者渴渴而不小便是也由少服五石

諸丸散積經年歲石熱結於腎中使人下睪虛熱

及至年衰血氣減少不復制於石熱獨盛則腎

為之燥腎燥故引水而不小便也其病變多癰

疽此坐熱氣留於經絡不利血氣癰滯故

病源論云消者渴渴而不小便是也由少服五石
諸丸散積經年歲石熱結於腎中使人下焦虛熱
及至年衰血氣減少不復制於石熱獨盛則腎
為之燥腎燥故引水而不小便也其病變多癰
疽此坐熱氣而於經絡不利血氣癰滿故
成癰膿

千金方云論曰凡積久與消未有不成消渴然則
大寒凝海而消不凍明其消性酷熱物無以加脯
及石塩鹹無以喻此之味消客耽者不離其口三
觴之後制不由已飲敢無度咀嚼酢腎不釋酸
鹹積年長夜酣興不懸遂使三焦猛熱五歲于
燥木石猶且焦枯在人何能不渴

小品方云說曰少時服五石諸丸散者積經年歲
久轉虛耗石熱結於腎中使人下焦虛熱小便
數利則作消利之病不渴而小便自利也
作消渴之疾但渴不利也又作渴利之
病隨飲小便也又作強中病之者並長興終不
痿溺液自出之作瘻瘻之病凡如此等宜服猪
腎薤蕒湯制其腎中石熱將飼鴨通丸便差也
其方在本書

又云鉉丹散治消渴小便便方
鉉丹二分 枯樓十分 澤馬五分 石膏五分
赤石脂五分 白石脂五分 胡椒二分 甘草十分

病源論云
諸中病者
是少服
五石丸
主治中
下焦虛

痼論云
強中病者
是由少脈
五石之藥
主黃中
下焦虛

瘰癧液自出山為作瘰癧之病在凡如此等宜服猪
腎一薺腎荒湯腎制其腎中石漿腎時飼鴨二通三凡便差也十五又

其方在本書

又云 鈎丹散治消渴止小便方

鉉一名鉉華
 丹一名丹華
 二一名二華
 分一名分華
 枯一名枯華
 樓一名樓華
 十一名十華
 分一名分華

澤馬五久

石膏五分

赤石脂五分
白石脂五分

胡椒二分

甘草十八

凡八物治下獲瀉服方

附
卷
目
三
下

知稍增年

服^サ半^ニ得^レ病^ヲ一^ニ年^ヲ服^ス

樂一日愈

二年二日

者夜以水服勿用酒

又云伯曰飲一石許小便不通枯樓丸方

栝樓三分
鉅丹三分

葛根三升

附子一分

凡四物治下痿丸如梧子飲服十九日三

又治消渴方

取活螺三斗以江水一石養之頃取冷汁配飲之

經曰放去更取新者漬之

又云灸消渴法

參開元一處又使兩處各二十一處各及廿壯年

日一報至百五十帖

今葉明堂云。開元在曆下三寸
千金方。發胃管穴。

千金方治消渴方

飲豉汁任性多少

又方濃煮竹根汁飲之

又方黃青梁米汁飲之

又云栝樓散治大渴秘方

深堀大枯樓厚削皮至白クホリ
カネウ
シケ
ナ
ヒツセ
上

千金方治消渴方

飲豉汁任性多少

又方濃煮竹根汁飲之

又方煮青梁米汁飲之

又云栝樓根治大渴秘方

深掘大栝樓厚削皮至白裏心寸切之水浸一日一

易水經五日出取鴛以絹帟碎之如米粉法水服

方寸匕日三四点可作粉粥乳酪中食之不限多

少取差

葛氏方治卒消渴小便多方

多作竹瀝飲恣口數日愈

又方破故屋凡煮之多飲汁

又方石膏半斤鴛碎以水一斗煮取五升稍服

又方栝樓根薄切炙五兩水五升煮取四升飲之

錄驗方治消渴日飲六七斗小麦湯方

小麦一升栝樓根切一升 麥門冬一升

右三物以水三斗煮取一斗半飲之

新錄方治消渴方

夏消恣意飲之取差

鴛生葛汁飲之

龍門方療消渴方

生胡麻油一升頓服之立驗

又方爛煮葵汁置冷露中每渴即飲之

僧深方治消渴唇干口燥芍杞湯方

生胡麻油一升頓服之立驗

又方
鴉生葛汁飲之

龍門方療消渴方

生胡麻油一升頓服之三驗

又方爛煮葵汁置冷露中每渴即飲之

僧深方治消渴唇干口燥芎朮湯方

芎朮根五升剉皮石膏一升一名細石小麦三升一方小豆

凡三物切以水加上洗手合煮麥熟湯成去滓適

寒溫飲之

搔要方療渴身體發腫方

第根三升丁回文提破以水二斗煮取二升一日服盡可

服一副

經心方黍米湯治渴神方

干黍米一升以水三升煮取一升去滓服一升日再

服良

耆婆方治人渴方

栝樓十兩カスガ白梁米五小升ミツキル

右以水一斗二升煮取三升去滓久三服

范汪方治消渴湯方

麦門冬一兩ヒサフネ玄依根二兩ヒサフネ竹葉一杞

凡三物文咀水七升煮取令得三升半久再服神有

驗

陶景本草注治消渴方

黃芩草汁及生十根之方鳥冬根長十

范汪方治消渴湯方

麥門冬一兩 ヒサシク 玄依根二兩 竹葉一杞

凡三物文咀水七升煮取令得三升半久再服神有

驗

陶景本草注治消渴方

煮葦草汁及生汁服之 ヒサシク 又方搗冬依紋服汁

蘇敬本草注治消渴方

食大麥麵良 ヒサシク 又單食來榭良

又方粟米粳泔汁飲之立差 ヒサシク

孟詵食經消渴方

麻子一升搗水三升煮三四沸去滓冷服半升日三

五日即愈 ヒサシク

今案渴家可食物

蘇蜜煎 治消渴 補血

石膏 一名細石 本草云主

青梁米 本草云主渴利 和名安波乃米

粟米 本草云主消渴和名 云阿波乃字而之稱

猕猴桃 崔禹玄主消渴 和名已久波

菰根 七卷食經云除消渴 和名已久乃稱

參蓂 本草注云消渴 和名加毛字利

松菜 本草云解消渴 和名太加奈

紫萁 七卷食經云消渴 和名波久倍良

骨蓬 本草云主消渴

寒水石 一名白石 本草云 主心渴

大麥 本草云主消渴 和名不止半支

小麥 本草云止燥渴 和名古半支

赤小豆 本草云心消渴 和名云阿加阿都支

馬芋 本草云主消渴 和名久和為

竹筴 本草云主消渴 和名多加半奈

葵菜 崔禹玄消渴 和名阿不此

蘆花 本草云主消渴大有驗 和名於保祿

蓴 本草云主消渴 和名奴奈波

石莖 崔禹玄治消渴

猕猴桃 崔禹云主消渴 和名已久波

菰根 七卷食经云除消渴 和名已久乃称

冬花 本草陶注云消渴 和名加毛字利

松菜 本草云解消渴 和名太加奈

紫萁 七卷食经云消渴 和名波久倍良

骨蓬 本草云主消渴 和名加波保称

紫苔 崔禹云心消渴 和名须羊乃利

酪 本草云止渴

鲤鱼 本草云止渴 和名已比

鳧 本草云心渴 和名加支

龍蹄子 崔禹云消渴利 和名在

河貝子 崔禹云主消渴 和名三奈

渴家可忌物

千金方云所慎者有三一則酒二則房室三則

鹹食及麵

養生要集云小麦合菰米食復飲酒令人消渴

小品方云忌食猪肉

治渴利方第二

病源論云渴利者隨飲隨少便是也由少時眼乳石

熱盛時房室過度致令腎氣虛耗下焦生熱

則腎燥則渴然腎腎虛又不能傳制水

液故隨飲隨小便也

葛氏方治大渴利日飲數斛小便亦尔者方

馬辛 本草云主消渴 和名久和為

竹筴 本草云主消渴 和名多加羊奈

葵菜 崔禹云消渴 和名阿不此

蘆荻 本草云主消渴大有驗 和名於保称

蓴 本草云主消渴 和名双奈波

石莖 崔禹云治消渴 和名右在

牛乳 本草云止渴 和名字之乃知

鹿頭 藥敬云主消渴 崔禹云主消渴

海月 崔禹云主消渴 和名久良介

石隕子 崔禹云主消渴利 和名加在

寄居 崔禹云主渴 和名加羊奈

田中羸子 本草云止渴 和名多都此

治渴利方第二

病源論云渴利者隨飲隨少便是也由少時服乳石
、勢盛時房室過度致令腎氣虛耗下焦生熱
、則腎燥、則渴然腎虛又不能傳制水

液故隨飲隨小便也

葛氏方治大渴利日飲數斛小便亦尔者方

栝樓 黃連 防己 鉅丹 分等鴉末以苦酒一合

水一合和作漿服方寸匕日三

范汪方治渴日飲一斛小便如之栝樓湯方

栝樓二兩 黃連一升 甘草二兩

凡三物水五升煮取二升半分三服

集驗方治渴日飲一斛者方

入地三尺取桑根白皮及令黃黑細切以水令

相淹煮之以味濃為度熱飲之勿与塩与米

非嫌大驗

治内消方第三

病源論云内消病者不渴而小便多是也由少服石

熱結於腎内熱之所作也

小品方云夫内消之為病皆熱中所作也小便多於

所飲令人虛極短氣内消者食物皆消作小便去

而不渴也治之宜起湯

芎藭枝葉一斤 各組三兩 栝樓根三兩

石膏三兩 一方 黃連三兩 甘草二兩

勢結於腎內勢之所作也

小品方云夫內消之為病皆勢中所作也小便多於所飲令人虛極短氣內消者食物皆消作小便去而不渴也治之^能芎藭湯

芎藭枝葉一斤

各根三兩

栝樓根三兩

石膏三兩

一方

黃連三兩

甘草二兩

凡五物切以水一斗煮取三升一服五合日三

又古治小便多晝夜數十起方

小豆生藿一把凡一物搏絞平取汁頻飲三升便

愈^能治小兒利

令李方治小便利多秦膠散方

秦膠一分 陳芥子二分

凡二物治下篩酒服方寸匕日三

治諸淋方第四

病源論云諸淋者由腎虛而膀胱熱故也其狀小

便出少起數小腹絃急痛引於膺

葛氏方治卒患淋方

冬足大指前節上十壯良

又方灸兩足外踝中央近年壯有石即下

又方但服葎草汁一升不過三升治石淋

又方豉一升水三升漬少時以塩一合內中頻服

經心方豉半升水四升煮

一沸頻服豆通不加塩

樣要云療淋方

各足大指前節上十此良

又方灸兩足外踝中央追年此有石即下

又方但服葎草汁一升不過三升治石淋

又方豉一升水三升漬少時以塩一合內中頻服

經心方豉半升水四升煮
一沸頻服豆通不加塩

極要云療淋方

石煮石醵汁飲之良驗以水煮之

范汪方治淋滑石散方

葵子一升 滑石一兩 通草二兩

凡三物治後酒服方寸匕日三

石韋石韋一名石葉
自石中出
隨雨飛墜
者也又云治淋枯樓散方

石韋二分 通草一分 枯樓二分

葵子四分

凡四物治後先食以麥粥服方寸匕日三無不愈

不又方常以冬葵根作飲良

小品方治淋病不得小便陰上絞痛方

灸足大衝五十壯 在足大指本
前後二寸

又方灸懸泉一名中封十四壯 中封在足
內踝前寸

廣利方理諸淋小便卒不通方

麻根二十七枚 切

右以水二大升煎取八九合去滓分溫三服

集驗方卒得淋方

取牛耳中毛燒服半錢上立愈

又方灸懸泉一名中封十四壯
又方灸懸泉一名中封十四壯
內踝前寸

麻根二七枚切

右以水二大升煎取八九合去滓分溫三服

集驗方卒得淋方

取牛耳中毛燒服半錢上立愈

又方以七輪錢三百文以水一斗煮得三升飲之

千金秘不傳

錄驗方治淋瞿麥散方

瞿麥四兩 石棗四兩 滑石四兩

車前子四兩 葵子四兩

凡五物搗篩冷水服方寸匕日三增至五匕慎

酒麴

新錄方治淋方

馬莧莖菜鴉汁一升二三服

治石淋方第五

病源論云石淋者淋而出石也腎主水結則化為

石故腎客沙石腎虛為勢所蓄熱則成淋其狀

小便莖裏痛尿不能卒出痛引少腹膀胱裏急

沙石從小便道出甚者塞痛令悶絕

小品方治石淋神方

車前子二升以絹囊盛以水八升煮取三升盡

服之日移一大石子當出宿不食飲之良

當溺石

又方取故甑煑燒三指撮服即通

又方石首魚頭中石一升貝齒一升合搗細篩

以苦酒和分爲三服宿不食明且服一分白

中服一升暮服一升明日且石患下

今案食經云鰾頭中有

石江南人呼曰石首魚者是也

千金方石淋方

浮石取滿手下篩水三升酢一升煮取二升澄

澄清服一升三服石出

本草拾遺云有以病爲藥者淋石主石淋水磨服

之當碎石隨溺出也人患石淋或於溺中出正如

小石非他物也

新錄方治石淋方

生葛根汁服五六合

又方葱白三升水六升煮取二升五合三服

陶景本草注煮麻根飲之

藥敬本草注鴉烏芋根汁一升服之

崔禹食經煮葵子服之汁

治氣淋方第六

病源論云氣淋者腎虛膀胱熱氣脹所爲也其狀

膀胱少腹皆滿尿澀常有餘瀝是也

千金方療氣淋方

必開元五十帖又必夾玉泉相去一寸半卅帖

治氣淋方第六

病源論云氣淋者腎虛膀胱熱氣脹所為也其狀
膀胱少腹皆滿尿澀常有餘瀝是也

千金方療氣淋方

各開元五十壯又炙去玉泉相去一寸半卅壯

又方水三升煮取八合底苦如鴨甲大取二升一服

又方鴉葵子末湯服方寸匕

廣利方理氣淋暗下切痛方

以鹽和少醋填臍中鹽上炙二七壯五老

治勞淋方第七

病源論云勞淋者謂勞傷腎氣而生熱成淋也腎

氣通於陰其狀尿留莖內數起不出引少腹痛小

便不利勞倦即發

千金方療百淋寒淋熱淋勞淋小便澀肥中滿腹

急痛方

栝樓三兩

滑石二兩

石棗二兩

三味大麥粥飲服方寸匕日三

治膏淋方第八

病源論云膏淋者淋而其肥狀似膏故謂之膏淋

急日肉淋此腎虛不能制其肥液相與小便俱出也

千金方云膏淋之為尿似膏自出療之一如氣淋

也鴉葵草汁二升酢二合和空腹服之

治膏淋方第八

病源論云膏淋者淋而其肥狀似膏故謂之膏淋

也日肉淋此腎虛不能制其肥液相與小便俱出也

千金方云膏淋之為尿似膏自出療之一如氣淋

也 鳩律草汁二升酢二合和空腹服之

治血淋方第九

病源論云血淋者是勢之甚者則尿血謂之血淋心

主血之行身通遍經絡脩環府藏勞熱甚者則散

失其常經溢添入胞而成血淋之

廣濟方治血淋方

車前菜鴉取汁半升和蜜一匙攪合銷頓

服之立差 廣利方

龍門方治血淋方

取刺薊根勿見風大一握淨洗鴉取汁半升

水服之極者不過三良

千金方療血淋方

石棗 當歸 蒲黃 夕藥 四味丸

等酒服一錢上日二

又方水五升煮麻根十枚取二升頓服

又方水四升煮大豆菜一把取二升頓服

又方灸丹田隨年壯在脊下二寸今案明堂

云石門一名丹田

等酒脹一錢上日二

又方水五升煮麻根十枚取二升頓服

又方水四升煮大豆葉一把取二升頓服

又方灸丹田隨年壯在脊下二寸今案明堂

云石門一名丹田

治熱淋方第十

上焦中焦
下焦謂之

病源論云熱淋者三焦有熱氣搏於腎流入於肥

而成淋也其狀小便赤澀必有宿為淋今得熱而發

者其熱則變尿血必有小便後如豆羹汁狀者畜

作有時

葛氏方熱淋方

取白茅根四斤剉之子問又破折傷也水一斗五升煮令得五升

汁服日三千金方

又方米滑石屑水服一二合

錄驗方治熱淋方

蘆心切三升水五升煮取二升三服

千金方治熱淋方

常煮冬葵根作飲服之

又方冬葵與氣淋同之

又方葵根一升冬用子大棗二七枚去核

二味水三升煮取一升二合分二服熱加黃芩

一兩出難加滑石二兩

常煮冬葵根作飲服之

又方冬冬葵根冬與氣淋同之

又方葵根一升冬用子大棗二七枚去核

二味水三升煮取一升二合分二服熱加黃芩

一雨出難加滑石二雨

龍門方療熱淋方

服冷水三升行一里即下寒

又方葵雨足外踝中央隨手按有石下

廣濟方療熱淋小便澀痛方

車前草切一升通草三兩葵根切一升

芒消六分湯切以水七升煮取二升去滓內芒

消分溫三服忌熱食

治寒淋方第士

病源論云寒淋者其病先寒戰然後尿是也由腎

氣虛弱下焦受於冷氣入肥與心氣交爭寒氣

則戰寒而成淋心氣勝戰寒解故得小便也

新錄方治寒淋少腹下冷平足冷方

葵子一升麴末一升水六升煮取三升半三服

又方葵子一升小麦一升六升煮取三升三服

治大小便不通方第十二

病源論云開格大小便不通也大便秘不通謂之內關

小便不通謂之外格二便俱不通為閉格也由陰

葵子一升 麴米一升 水六升 煮取三升 半三服

又方葵子一升 小麦一升 水六升 煮取三升 三服

治大小便不通方第十三

病源論云開格大小便不通也大便不通謂之內關小便不通謂之外格二便俱不通為閉格也由陰陽不和榮衛不通也

千金方治開格大小便不通芒消湯方

芒消五兩 一名石脾 大黃八兩 才木 夕藥四兩 正七枚

杏仁四兩 麻子人三兩 烏桕樹根皮五兩

凡六味以水七升 煮取三升 分三服

又方葵齋下一寸三分

又方葵橫文百壯

又方孰帶煮取汁和蒲黃方寸匕日三服

又方葵子一升 榆皮切一升 水五升 煮取二升 分三服

人方

葛氏方治卒開格大小便不通文滿欲死二三日則斂

人方

取塩以苦酒和塗脊中干復易之

又方自取手十指爪燒末以酒漿服

又方葵子二升 水四升 煮取一升 頓服之內猪

膏如鷄子一丸 三佳

集驗方治久不得大小便方

取塩以苦酒和塗脊中干復易之

又方自取手十指凡甲燒末以酒漿服

又方葵子二升水四升煮取一升頓服之內猪

膏如鷄子一丸三佳

集驗方治久不得大小便方

猪脂如鷄子著一杯酒中煮之令沸頓服

又方葵根汁服弥佳

范汪方治大小便不出方

豆將冒內下部中令人吹則通小便以塩內

莖中則利良

經心方滑石散治大小便不通方

滑石二兩 榆皮一兩 葵子一兩

凡三物作散煮麻子一升半取一升八兩匕和

服不過二丈小便通 千金方

廣利方理氣權開格不通小便淋結者下方悶氣

兼痛方

冬葵子二大合 生茱根一握以水一大升

半煎取六丈合去滓分溫二服

又玄開障不通肥脹妨悶大小便不通方

冬葵子三丈合 綿裹 滑石十二分 碎

礎消十分 下 易成 切以水二大升煎取

八大合去滓空服分溫再服別如人行四

半煎取六太合去滓分溫二服

又云開胃不通肥脹妨同大小便不通方

冬葵子三太合綿裹滑石十二分碎

礎消十分下切以水二大升煎取

八大合去滓空服分溫再服別如人行四

五里忌肉麵

治大便不通方第十三

病源論云大便不通者猶三焦五藏不和冷熱之氣

不調熱氣偏入腸胃津液竭燥故令糟粕不結擁

塞不通也

葛氏方治大便不通方

研麻子以米雜為粥食之亦可直煮麻為

飲服之

又方剝烏梅皮以漬將豆中導下部

范汪方治大便不通方

用豆醬內下部中則通

又方將胃中液切令如指長三寸內大孔中

秦承祖方不得大便數日方

作熱湯著甕中人居其中湯未冷則寒

又方灸下部後五分壯大良

千金方治大便不通方

桑根一杞去赤皮榆根一杞去赤皮

秦蕤祖方不得大便數日方

作熱湯著甕中人居其中湯未冷則寒

又方冬下部後五升此壯者大良

千金方治大便不通方

桑根一杞去赤皮 榆根一杞去赤皮

水三升煮取一升半分二服

又方恒煮麻子取汁飲之

龍門方療大便不通方

取膠廣二寸長四寸葱白一握以水三升和煮消

盡去滓一服驗

又方葵子半升搗末以水一升煮服之

醫門方療下部閉塞大行不出方

取烏梅廿枚柏砵湯中浸少時去核搗之如渾

丸大一枚內下部中立通

小品方大便閉塞氣結心滿方

灸石闕百壯 今案明堂在幽門下二寸

又方灸足大都隨年壯

經心方夕藥湯治脹滿大行不通方

夕藥六分 芒消六分 黃芩五分

大黃八分 杏仁八分

凡五味丸如梧子飲服十五丸日三

華他方云有病日食二斗米至二百日不大便亦元

經心方夕藥湯治脹滿大行不通方

夕藥六分

芒消六分

黃芩五分

大黃八分

杏仁八分

凡五味丸如梧子飲服十五丸日三

華他方云有病日食二斗米至二百日不大便亦元

所痛苦何以尔名為何等病也此為穀瘦也穀

氣液牛道中去雖无病下閉不通不可長久治

之方

葛根五斤

猪肪三斤

凡二物葛根細剉洗之以水三斗煮之得

一斗半去滓復煎其汁得七升已取猪肪

肪切莖之成膏著葛根汁中煮使相得四

升所服二升二日盡之下開通營衛澤藥

無所禁服此藥開六府當下

治大便難方第十四

病源論云大便難者由五藏不調陰陽偏有虛

實三焦不和則冷熱并結故也

又云渴利之家大便之難為津液枯竭致令腸

胃乾燥

葛氏方云脾胃不和常患大便堅強難者

大黃三兩

夕藥三兩

厚朴三兩

枳實六斤

麻子人五合

又云渴利之家大便之難為津液枯竭致令腸
胃乾燥カキカキ

葛氏方云脾胃不和常患大便堅強難者カキ

大黃三兩オホシ 夕藥三兩エヒルクリ 厚朴三兩ホコハノキ

枳實六斤カクシヤク 麻子八五合

搗篩蜜丸如梧子服十丸日三稍增以通セ

利為度可恒將之セキナリ

千金方治大便難方

單用豉清將胃清羊脂去依根汁並單灌ヒトヘ

之立出又方將胃清漬為梅灌下部中トコ

又方麻油二升內葱白三寸煮令黑去滓待キツネ

冷頓服又方炙萊菔三枚ヒヤカキム

又方夾玉泉相去各二寸炙之セヨ

新錄方大便乾骨立者方

灸胃管穴千主セヨ

又方生地黄切三升キシレ 華切三升コミナ 以水一斗煮ヒシ

取二升五合分三服相去十里ハカリ

又方車眼馬莧汁一升ヨムトヒシ 差心ナ

又方鴉蒜為泥ヒレ 酒服如棗日三モテ

又方燒魚為灰ヒレ 酒服方寸匕日二三ナハタ

又方服飢帶汁五六合日二コシホラ

承祖方治大便穿難腹墜連日欲死方カクナリ

又方軍眼馬莧汁一升差心

又方鴉蒜為泥酒服如棗日三

又方燒魚為灰酒服方寸匕日二三

又方服翫帶汁五六合日二

承祖方治大便牢難腹堅連日欲死方

甘遂光花黃芩

凡三物各等鴉丸如小豆

服五丸不通更服三丸

華他方治大便堅數清不能得出方

皂莢末下篩以猪脂和合葦管長一寸以指排

內穀道中者指一節須臾則去

又云二車丸主臨飯腹痛不能食復又大便難方

大黃十三兩

紫胡四兩

細辛二兩

茯苓一升

半夏一兩

凡五物治諸九以蜜飲服如梧子五九日再

集驗方治大便牢難腹堅連日欲死方

白蜜三升於微火上煎之使如強鋪以投冷水

中須臾當凝出九如手指大長六寸七寸內

穀道中即得通

又云不得大便十日或一月煩滿欲死方

葵子二升水以四升煮取一升去滓頓服之

治大便失禁方第十五

病源論云大便失禁者大腸與肝門虛冷滑故也肝

穀道中即得通

又云不得大便十日或一月煩滿欲死方

葵子二升水以四升煮取一升去滓頓服之

治大便失禁方第十五

病源論云大便失禁者大腸與肛門虛冷滑故也肛

門大腸之候也俱主行糟粕既虛弱冷滑氣不能

能溫制故使大便失禁之

千金方治老人小兒大便失禁

炙大指奇間各三壯兩脚

又方灸兩脚大指甲一寸三壯

治大便下血方第十六

病源論云此由五藏傷損所為藏氣既傷則風邪

易入熱氣在內亦大便下血其前便後下血者

血來遠也前下血後便者血來近也遠近者言

病在上焦下焦也

小品方云諸下血者先見血後見便此為遠血宜服

黃土湯若先見便後見血此是近血宜服赤小豆

散赤小豆散方

赤小豆三升熬

凡二物治遠眼方 寸匕日三 連二兩酒服

黃土湯方

竈中黃土半升綿裹 甘草三兩 炙

散赤小豆散方

赤小豆三升熬ヤチセリ

當歸三兩オホセリ

凡二物治瘧眼方

寸匕日三

今案令李方黃連二兩酒服カニクシ

黃土湯方

竈中黃土半升綿裹モナハミ

甘草三兩炙

干薑二兩

黃芩三兩ヒニシキ

阿膠三兩ニカハ

陶景注云出東阿故名之

干地黄五兩一方三兩

凡六物以水一斗煮取

取三升分三服

今案集驗方有芍藥艾元黃芩于地黃治下血如刺猪

葛氏方治卒下血方

豉一升以水三升漬煮三沸去滓セキ 頃服汁一升セキ

日三冬天每服輒溫セキ

又方豉二升以酒六升合煮得三升服一升日三セキ

又方煮香葉イヌエ 極令濃去滓服一升日三セキ

又方亂髮如鷄子大燒末水服之不過三セキ

又方三指撮塩燒向東服之セキ

又方灸兩足大指迴毛中追年壯即愈セキ

僧深方治卒下血補黃散方

甘草一分

干薑一分

蒲黃一分カキハナ

凡三物下篩酒服方寸匕日三

又方治卒注下并下血一日一夜數十行方セキ

炙膏中及膏下一寸各五十粒セキ

今案葛氏方以錢掩膏上炙錢

下除五セキ

十粒

甘草一分 干薑一分 蒲黃一分

凡三物下瘀瀉服方寸匕日三

又方治卒注下并下血一日一夜數十行方

炙廬中及廬下一寸各五十粒今案葛氏方以錢掩廬上炙錢

下除五

醫門方治卒下血或目契契物而發方

生薑根汁 生地黄汁 生藕根

汁各飲一升日二卷 又方小豆末和水服

方寸匕日二服立差

范汪方治下血方

干地黄五兩 膠三炙

凡二物治瘕久三服葛氏方可之

又方干地黄下 薤白瀉服方寸匕日三

又云治大便血諸血衄血方

烏賊魚骨五分 桑耳一分

凡二物治瘕瀉服方寸匕日三

千金方下血日夜七八十行方

黃連四兩 黃蘗四兩 二米淳酢五升煮

取一升半久再服

枕中方治人下血方

取鷄蘗紋取汁多少任意服之愈今案集驗方治

生血下血并 婦人漏下

黃連四兩

黃蘗四兩

二味淳酢五升煮

取一升半久再服

枕中方治人下血方

取鷄蘗紋取汁多少任意服之愈

今案集驗方治

婦人漏下

新錄方治卒下血兼血痔方

艾子及皮一升以水三升煮取一升三合分二

服

又方桃奴樹上死桃子也取一升以水三升煮取一升

三合分二服

又方取敗胎第二升以水三升煮取一升二分二服

又方荆菜切三升以酒五升煮取一升六合分二服

又方布小豆三升以水五升煮取一升六合汁渴飲

汁飢取豆

又方以水三升煮葱白一升半取一升二合汁分

三服

又云食契物下血方

鳩生葛根取七八合汁飲之

又方鳩生地黃取汁飲七八合

又方鳩生藕取汁飲七八合

又方生薑荷根汁飲六七合

又方酒三升煮大棗廿一枚取汁分二三服

鴉生葛根取七八合汁飲之

又方鴉生地黃取汁飲七八合

又方鴉生藕取汁飲七八合

又方生蕞荷根汁飲六七合

又方酒三升煮大棗廿一枚取汁分二三服

又方一水服石榴皮末方寸匕日二

又方鴉薊無問大小猫屎羊等取汁飲之

並好若冬月無生者掘取根或乾者切

二升以水三升煮取一升分二服

治小便不通方第十七

病源論云小便不通者膀胱與腎俱有熱故也腎

主水膀胱為津液之府此二經為表裏而水行於

小腹入肥者為小便腎與膀胱熱入於肥熱氣

大盛故結澁令小便不通

葛氏方治小便不通方

熬塩令熱內囊中以熨小腹上

又方以塩滿唇灸上三壯

又方未滑石水服方寸匕

又方以衣中白魚虫內小孔中

千金方治小便不通方

水四升洗甌帶取汁煮葵子取二升半分

又方葵子車子水五升煮取二升半三服

本草云小薊根
止衄血通身注云
本薊是薊
本薊方藥不用
又有半薊

又方未滑石水服方寸匕

又方以衣中白鱼虫イシヨ内小孔中

千金方治小便不通方

水四升洗ツルネキ甑ツルネキ帶取汁煮葵子取二升半分

三服

又方葵子アヲヒ車子オホハナ水五升煮取二升半三服

又方鯉鱼コヒ鳊灰末酒服方寸匕日三

又方真頭石末水服方寸匕日三

鯉魚首石

新録方治小便不通方

水漬石迷ヒソメ耐少腹下出或燒石アヲヒ墊耐少腹

以出為度

又方車前子オホハナ一市以水三升煮取一升二合并

服

小品方小便不通及閉格方

取生土ヒヒク茯苓根アヲ擣取汁以少水ヒヒク解之於筒中

吹内下部即通秘方

又云治小便閉方

豉半升水四升煮一沸去滓ヒヒク一服立愈通

醫門方療小便不通方

取乱髮アヲヒ如拳火燒作灰末ヒヒク酒服方寸匕立

愈

又云療小便不通小腹滿悶不急療致人方

葱白切一合イシヨ塩少許イシヨ擣イシヨ絞取汁イシヨ灌三五

豉半升水四升煮一沸去滓一服立愈通

醫門方療小便不通方

取乱髮如拳火燒作灰米篩酒服方寸匕立愈

又云療小便不通小腹滿悶不急療效人方

葱白切一合塩少許搗絞取汁灌三五

豆粗許入水道中水便出極効

集驗方治淋小便不利陰痛石壽散方

石壽二兩 瞿麥一兩 滑石五兩

車前子三兩 葵子二兩

凡五物下篩先食服方寸匕日三

令李方治淋胞滿不得小便滑石散方

滑石一兩 通草半兩 石壽一兩

凡三物治後酒脹方寸匕日三

范汪方治小便不通方

取陳葵子一升淳酒三升煮之脹盡

治小便難方第十八

病源論云小便難者此亦是腎與膀胱熱故

故也

錄驗方治小便難淋瀝方

通草二兩 伏苓二兩 亭歷子二兩

葵 凡三物下篩以水脹方寸匕日三

新錄單方治小便不出腹滿氣急者方

病源論云小便難者此亦是腎與膀胱契故
故也

錄驗方治小便難淋瀝方

通草二兩

伏苓二兩

亭歷子二兩

凡三物下篩以水脹方寸匕日三

新錄單方治小便不出腹滿氣急者方

灸關元穴在臍下三寸依年壯

又方車前草切三升以水五升煮取二升

分二脹日一

又方翫帶一枚以水五升煮取一升六合并服

又方大麻子三升以水五升煮麻子腹破分服

又方煮滑石取汁飲之立下

又方葵子二升以水四升煮取一升六合分三服

又方第根切二升煮服依前煎去渴最妙

醫門方療小便難方

以少塩内莖孔中即通

治小便數方第十九

病洎論云小便數者膀胱與腎俱虛而有客

熱乘之故也

范汪方治小便一日一夜數十行方

昌蒲黃連二物分等治節酒脹方寸匕

又方石膏半斤咬咀以水一斗煮取五升

稍脹已上葛氏

病疸論云小便數者膀胱與腎俱虛而有客
熱乘之故也

范汪方治小便利度非淋方

昌蒲黃連二物分等治肺酒脹方寸匕

又方石膏半斤咬咀以水一斗煮取五升

稍脹已上葛氏方同之

千金方治小便利度非淋方

榆白皮二斤水一斗煮取五升服三合日三

又方三年重鶴巢燒末服之

葛氏方治小便利度非淋一日數十過令人

疲瘦方桑榆下第二柏本即第一理七壯

又方不中水猪膏如鷄子者一枚炙下取

肥汁盡服之不過三此二方并治遺溺也

又方鷄腸草一把熟棗酒一升漬一時絞去

滓久并服

醫門方療小便數日夜出無節度方

小豆苗葉搗絞取汁飲一二升立止極効

治小便不禁方第廿

病源論云小便不禁者腎氣虛下焦受冷也腎主

主水其氣下通於陰腎虛下焦冷不能溫制其

水液故小便不禁

雜錄方治小便不禁方

栢樹白皮切二升以水三升煮取一升二合分

治小便不禁方第六

病源論云小便不禁者腎氣虛下焦受冷也腎主水液故小便不禁

雜錄方治小便不禁方

栢樹白皮切二升以水三升煮取一升二合分再服相去十里

又方故甌帶以水三升煮取一升二合分二服

又方露蜂房灰酒服方寸匕日二

又方石榴皮子灰酒服方寸匕

又方榆白皮切二升水四升煮取一升六合二服

合李方小便不禁數行方

當歸二兩

甘草五分

凡二物治下諸漏

服半錢上日三一月若夏月內伏苓陰腫痛口黃者分等

槩要方療小便不禁或如血色方

麥門冬八兩

茯苓子二兩

甘草一兩

乾薑四兩

桂心二兩

干地黄八兩

續斷八分

石水一斗煮取二升半分三服

治小便黃赤白黑方第六

僧深方治膀胱急契小便黃赤滑石湯方

滑石八兩

子苓三兩

車前子一升

葵十一升

榆皮四兩

乾薑四兩

桂心二兩

干地黄八兩

續斷八分

ハミキ七杜緩文
オニノヤカラ

石水一斗煮取二升半分三服

治小便黃赤白黑方第廿一

僧深方治膀胱急契小便黃赤滑石湯方

滑石八兩

碎

子苓三兩

車前子一升

葵十一升

榆皮四兩

凡五物以水七升煮取三升分三服

龍門方療人小便白稠方

取蜂房燒作灰和水一服一匕

范汪方治小便神多而或白精從溺後出方

枯樓三分

滑石二分

石葦一分

三物為散麥粥服方寸匕日三

又云治小便白濁而多方

桑茸三分

甘草五分

二物為散以酢

漿服方寸匕日三

又云治虛羸少便青黃白黑白如米汁方

白善六分

龍骨五分

牡蠣二分

小豆三兩

煑

去薇根二分

凡五物治後以酒服

一方寸匕日三

治小便血方第廿二

病源論云心主於血与小腸合若心家有熱結於小

腸故小便血也

養生方云人食甜醅勿食大酢變為尿血也

小豆三兩燬去衣根二升凡五物治以酒服

一方寸匕日三

治小便血方第廿二

病源論云心主於血与小腸合若心家有熱結於小

腸故小便血也

養生方云人食甜醕勿食大酢變為尿血也

新錄方治尿血方

車前草取絞取汁服五合旦空腹服之

又方棘刺二升水四升煮取二升分三服

范汪方治小便血方

焉芋根五升搗取汁服一升

千金方治尿血方

豉二升酒四升煮取一升頓服

又方生大麻根十枚水五升煮取二升分三服

又方龍骨細末溫酒服方寸匕

又方燬塩熱熨少腹并主淋大良

又方刮滑石屑水和塗少腹繞陰際佳

又方桑大敦穴隨年壯

又云治房損傷中尿血方

牡蠣 車前子 桂心 黃芩

四味下篩飲服方寸匕日三加至二匕

又云治虛勞尿血淋方

葵子一升水三升煮取一升半日三

又方發大敦穴隨年壯

又云治房損傷中尿血方

牡蠣

車前子

桂心

黃芩

渠金

四味下篩飲服方寸匕日三加至二匕

又云治虛勞尿血淋方

葵子一升水三升煮取一升半日三

葛氏方治小便血方

萊根一把切煮去滓數飲之

又方楊慈白取汁服一升

小品方治生地黄湯治小便血方

生地黄半斤

柏葉一把

黃芩二兩

膠二兩

甘草二兩

凡五物以水七升煮

取三升絞去滓內膠令得二升半分三服

傳清安衆方療小便出血方

地黄汁一升

薑汁一合

相和頓服未差再

服

治遺尿方第廿三

病源論云遺尿者此由膀胱虛冷不能約於水故也

范汪方治人喜遺尿方

防己防風各三分葵子二分治未服方寸匕一方

防己三升

又方燔石牡蠣分等治合以黍粥服方寸匕日三

令李方治遺溺夕藥散方

病源論云遺尿者此由膀胱虛冷不能約水故也
永傳又救也一之生也

范汪方治人喜遺尿方

防已ハナハナ 防風ハナハナ 各三升 葵子アヲヒ 二升 治未服方寸匕一方

防已三升

又方ホシ 燐石シロキナヒ 牡蠣セキ 分等治合以黍粥服方寸匕日三

令李方治遺溺夕藥散方

白薇アヲヒ 一兩 夕藥セキ 一兩 凡二物治合下篩酒

若水服方寸匕日三

龍門方治遺尿不禁方

取鷄巢中乳屬又雞也 薄燒灰服一錢上日三七日老

今案本草拾遺云水進方寸匕日三歲

錄驗方治遺尿龍骨散方

來茸ハナハナ 三兩 燐石ホシ 二兩 牡蠣セキ 二兩

龍骨タハハネ 三兩

凡四物合治下篩服方寸匕日三

千金方治遺尿小便澀方

木防已アヲヒ 二兩 葵子アヲヒ 二兩 防風ハナハナ 三兩

三味水五升煮取二升半分三服散水服佳

小品方治遺尿癸

灸遺道在俠玉泉五升隨年壯

又方灸陽陵泉陰陵泉隨年壯在膝下一寸

治尿淋方第廿四

病源論云人有於眠睡不覺尿出者是其稟質陰

三味水五升煮取二升半分三服散之時佳

灸遺道在使玉泉五入隨手然

又方灸陽陵泉陰陵泉隨手然在膝下一寸

治尿淋方第廿

病源論云人有於眠睡不覺尿出者是其稟質陰

氣偏盛陽氣偏虛者則膀胱腎氣俱冷不能溫制

於水則小便偏多或不禁而遺失

新錄方治尿床方

大麻根皮切三升以水五升煮取一升八合去滓

分二服小兒減之

又方大豆葉三升水五升煮取二升分三服

醫心方卷第十二